FRAKCIONIRANA ABRAZIJA - ČIŠČENJE

Spoštovani,

za zdravljenje, ki vam ga predlagamo, je potrebna vaša privolitev. Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.

OPIS BOLEZNI IN POSEGA



Frakcionirana abrazija je operativni poseg, potreben bodisi zaradi nepravilne krvavitve iz maternice, ugotovljenih patoloških sprememb v brisu, ali kadar pri ultrazvočnem pregledu domnevamo, da gre za bolezensko spremembo v maternici. Tkivo, dobljeno z abrazijo, nato pošljemo na histopatološko preiskavo. Glede na rezultat preiskave se zdravnik odloči, kakšno bo nadaljnje zdravljenje, če bo potrebno.

Operativni poseg opravimo v splošni anesteziji in praviloma traja 10 do 15 minut. Pri posegu kirurg najprej s posebnim instrumentom (kireto) postrga sluznico materničnega vratu, nato z dilatatorji razširi cervikalni kanal, da lahko z večjo kireto postrga še sluznico iz telesa maternice. Dobljeno tkivo sluznic ločeno pošlje na histopatološko preiskavo (patolog pregleda celice pod mikroskopom).

ZAPLETI (neželeni, nenačrtovani dogodki med operacijo in po njej):

Pri **frakcionirani abraziji** so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem **vnetje, krvavitev ali poškodba (predrtje) maternice.**

- **Vnetje —** je posledica vdora bakterij v operacijsko rano, lahko med operacijo ali po njej. Bolečina se stopnjuje, rana je pordela, pojavita se lahko povišana temperatura in gnojen, smrdeč izcedek. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki. Pri hudih vnetjih je včasih potreben dodaten operativni poseg z odprtjem trebuha in odstranitvijo rodil.

- **Krvavitev —** praviloma traja do 7 dni in ne sme biti močnejša od mesečnega perila. Krvavitev, ki nastane zaradi posega samega, zaustavimo z zdravili. Pri hudih krvavitvah je včasih potreben dodaten operativni poseg z odprtjem trebušne votline in odstranitvijo rodil.

- **Poškodba (predrtje) maternice —** če pride do poškodbe maternice med samim posegom, sta potrebni podaljšana antibiotična zaščita in podaljšana hospitalizacija za 24 ur. V primeru večjega defekta v steni maternice pa je potrebna laparoskopska operacija — to pomeni, da moramo skozi rez pod popkom s kamero pogledati v trebuh in zašiti poškodovano steno maternice. Pri hudi poškodbi maternice lahko pride do dodatnih zapletov s poškodbo sosednjih organov, hudo krvavitvijo in/ali vnetjem.

Zaplete pri operacijah učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je okrevanje daljše in zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake možnih zapletov, pomoč poiščite pri izbranem ginekologu ali na Oddelku za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Izola, na telefonski številki 05 66 06 725 ali 05 66 06 727.

Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb